

แนวทางการจัดตั้ง Fever &ARI Clinic (Acute and Respiration)

โรงพยาบาลไชโย VS Covid-19


“coronavirus disease starting in 2019”

19 ก.พ. 2563

การดำเนินการ

- อบรมบุคลากรทุกระดับ /ทุกหน่วยงาน โรคและ PPE
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง จัดระบบคัดกรอง ห้องคลินิกโรคไข้หวัด OPD และ Clear เส้นทางเคลื่อนย้าย Admit ห้องแยกเชื้อ IPD
- ซ้อมแผนเสมือนจริง โดยมีพี่เลี้ยง(IC/SRRT) คอยควบคุมกำกับ
- ให้ความรู้ผู้รับบริการ /จัดกิจกรรมจิตอาสาณรงค์ป้องกัน
- ทำแผนจัดหา สื่อ เตรียมชุดอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น แยกใส่กล่องเพื่อให้พร้อมต่อการออกปฏิบัติงานจริง
- รายงานข้อมูลให้ สสจ.อ่างทอง/ กระทรวง ตามกำหนด

แผนผังจุดคัดกรองและเส้นทางเคลื่อนย้าย โรงพยาบาลไชโย



จุดคัดกรอง

ป้ายหน้า OPD

โปรดจัดวาง

มืออาคารข้อ 1 และ ข้อ 2

ข้อ 1

มีไว้

1 ไข้ 2 ไอ 3 เจ็บคอ 4 น้ำมูกไหล 5 หายใจเหนื่อยหอบ



ข้อ 2

- เดินทางมาจากประเทศจีน หรือ เมืองที่มีโรคระบาด
- ใกล้ชิด/สัมผัสคนป่วยโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา



ด้วยความปรารถนาดี จากโรงพยาบาลไชโย



ป้ายหน้า ER

โปรดจัดวาง

มืออาคารข้อ 1 และ ข้อ 2

ข้อ 1

มีไว้

1 ไข้ 2 ไอ 3 เจ็บคอ 4 น้ำมูกไหล 5 หายใจเหนื่อยหอบ




ข้อ 2

- เดินทางมาจากประเทศจีน หรือ เมืองที่มีโรคระบาด
- ใกล้ชิด/สัมผัสคนป่วยโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา



ด้วยความปรารถนาดี จากโรงพยาบาลไชโย

ซ้อมแผนเสมือนจริง เหตุการณ์จำลอง



ชี้แจงแผน



คัดกรอง/แยก



รายงานทีมรักษา



อุปกรณ์ป้องกัน



Admit IPD รอผลตรวจ



เอกซเรย์



ซักประวัติ/เจาะเลือด ห้องไข้หวัด



Admit ห้องแยก



Clear เส้นทางย้าย



ปัญหาอุปสรรค

- หน้ากากอนามัย (Mark) ไม่พอใช้ จัดซื้อไม่ได้ เนื่องจากมีการใช้เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าของภาวะปกติ

แก้ปัญหา: (ตัด Mark ผ่าให้เจ้าหน้าที่ คนละ 2 – 3 อัน ตามความจำเป็นใช้งาน / (ติดต่อบริษัทสำรองไว้ได้ 1 เดือน ใช้เฉพาะจำเป็น)

- ห้อง Negative Pressure ชำรุด ใช้งานไม่ได้ งบประมาณซ่อมราคาสูง

แก้ปัญหา: ใช้ห้องแยกโรคติดเชื้อเพื่อแยกโรค ขณะรอผลการตรวจ

- ห้องคลินิกไข้หวัด (Fever &ARI Clinic) อยู่ระหว่างการปรับปรุง

แก้ปัญหา: ใช้ห้องแยกโรคติดเชื้อสำรอง

ประกาศการใช้อุปกรณ์หน้ากากอนามัย (Mark)

โรงพยาบาลไชโย

- เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของไวรัส “โควิด-19” ทำให้หน้ากากอนามัย ไม่พอให้เบิกใช้ ไม่มีจำหน่าย จึงขอให้ใช้กรณีจำเป็น ดังนี้
- หน้ากากอนามัย N95 ใช้สำหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสใหม่
- หน้ากากอนามัยทางการแพทย์(สีฟ้า) ใช้สำหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรง และให้เฉพาะผู้ป่วยไข้หวัดมี ไอ จาม น้ำมูก ยกเว้น หมัด ใช้ **Mark** ผ้า
- หน้ากากอนามัยผ้า (Mark ผ้า) ใช้สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เบิกได้ท่านละ 2-3 อัน ที่คุณเสาวลักษณ์