



การใช้สมุนไพรไทยในบัญชียาหลัก แห่งชาติให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน จังหวัดอ่างทอง

นางสาวกฤษณา แสงนาค
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเตี้ย
อำเภอวิเศษชัยชาญ

การใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต.

ชอสมุนไพร เพชรสังฆาต (สูตร1/สูตร 2)



การใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต.

ชื่อสมุนไพร เพชรสังฆาต (สูตร1/สูตร 2)

การรักษาด้วยยาสมุนไพร



โรค/กลุ่มอาการ/ สรรพคุณ	ขนาด/วิธีใช้	ข้อควรระวัง ในการใช้	เทียบเคียงยาแผน ปัจจุบัน
1. ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid) 2. ท้องผูก (constipation)	รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที	<u>ข้อควรระวัง</u> ระวังการใช้ยาในหญิง ตั้งครรภ์และหญิงให้นม บุตร <u>อาการไม่พึงประสงค์</u> ท้องเสีย มวนท้อง	- Daflon - Siduol


การใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต.

ชื่อสมุนไพร เพชรสังฆาต

การรักษาด้วยยาสมุนไพรแบบโบราณ



แผนภูมิแสดงแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวาร



การใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต.

มะขามแขก



การใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต.

ชื่อสมุนไพร มะขามแขก

การรักษาด้วยยาสมุนไพร



โรค/กลุ่มอาการ/ สรรพคุณ	ขนาด/วิธีใช้	ข้อควรระวัง ในการใช้	เทียบเคียงยาแผนปัจจุบัน
ท้องผูก (constipation)	ชนิดแคปซูล 450 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ชาซอง 2 กรัม/ถุง รับประทานครั้งละ 1 ถุง แช่น้ำ ร้อน 200 ซีซี ดื่มก่อนนอน	ห้ามใช้ ในผู้ป่วยที่มีภาวะ ทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) ควรระวัง -การใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี -ในผู้ป่วย inflammatory bowel disease - การรับประทานยาใน ขนาดสูงอาจทำให้เกิดไต อักเสบ (nephritis)	1. Bisacodyl (ยาระบาย ชนิด Stimulants laxative) 2. Milk of magnesia



“มะขามแขก”

ทานต่อเนื่องทำให้ลำไส้ขี้เกียจ

การใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต.

เสลดพังพอน



การใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต.

ชื่อสมุนไพร เสดดพังพอน(ทิงเจอร์)



การรักษาด้วยยาสมุนไพร

โรค/กลุ่มอาการ/ สรรพคุณ	ขนาด/วิธีใช้	ข้อควรระวัง ในการใช้	เทียบเคียงยา แผนปัจจุบัน
เริม (Herpes simplex) งูสวัด (Herpes Zoster)	ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือทุก 4 ชม.	-	- Acyclovir cream
ผื่นคัน (Rash)	ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 3-4 ครั้ง	ระวังบริเวณ เนื้อเยื่ออ่อน ห้ามทาบริเวณ ผิวหนังที่มี บาดแผล	- Calamine lotion - Beta cream - TA 0.02 cream

การใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต.

ชื่อสมุนไพร เสดดพังพอน(กลีเซอรีน)



การรักษาด้วยยาสมุนไพร

โรค/กลุ่มอาการ/ สรรพคุณ	ขนาด/วิธีใช้	ข้อควรระวัง ในการใช้	เทียบเคียงยาแผน ปัจจุบัน
แผลร้อนใน (Aphthous Ulcers)	ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 3-4 ครั้ง	-	- triamcinolone oral paste
เริมที่ปาก (Herpes simplex)	ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 3-4 ครั้ง	-	- Acyclovir oral paste

